

5255.78



WICEWOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2018-06-26

ŚR-IV.6333.28.2018

URZĄD MIEJSKI W DUKLI	
Wydział	G
Wpłynęło	26. CZE. 2018
Ilość załączników	1
Podpis	

**Panie/Panowie
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin**

W związku z wpływającymi do tut. Urzędu licznymi sygnałami od osób prywatnych zgłaszających problem związany z występowaniem barszczu Sosnowskiego w miejscowościach wypoczynku, zwracam się z prośbą o rozpropagowanie dołączonej do niniejszego pisma informacji w Państwa gminie (ulotki PIORIN) o wysokiej szkodliwości tej rośliny.

Wiele roślin wspomnianego wyżej gatunku porasta koryta rzek i cieków wodnych oraz ciągi dróg, a zawarte w nich szkodliwe substancje kumarynowe stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Świadczą o tym liczne przypadki dotkliwych poparzeń bądź zatruc, jakie miały miejsce zarówno w latach ubiegłych, jak również w roku bieżącym. Sytuacjom takim sprzyja dużo częstszy kontakt ludzi ze środowiskiem przyrodniczym, jaki ma miejsce w sezonie letnim.

Dlatego też koniecznym wydaje się podejmowanie, a także kontynuowanie prowadzonych dotychczas na terenie Państwa jednostek działań, zmierzających do likwidacji bądź ograniczenia rozprzestrzeniania się tego gatunku.

WICEWOJEWODA PODKARPACKI

(-)

Lucyna Podhalicz

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)



Fot. 2. Kwitnące baldachy




Fot. 4. Pęd z dojrzewającymi baldachami (rozłupkami)

Fot. 3. Pęd pokryty włoskami



Fot. 5. Baldaszek z dojrzewającymi rozłupkami (nasionami)



Fot. 1. Kwitnąca roślina barszczu Sosnowskiego

Ulotka nie jest przeznaczona do celów komercyjnych

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną dwuletnią należącą do rodziny baldaszkowatych (selerowatych) (*Umbelliferae*). W pierwszym roku wywarza rozetę, a w drugim wyraasta pędy nasienne i powydłużanym nasion (owoców) rośliną zamierza. Niektóre jednak z niektórych rozet nie wyraстаją pędy i wówczas rośliny owocują później niż w drugim roku wegetacji, stając się roślinami wieloletnimi. W naturalnych siedliskach rośliną osiąga wysokość do 1,5 m. W Polsce warunki rozwoju dla barszczu Sosnowskiego są wyjątkowo korzystne, dlatego niektóre osobniki dorastają, nawet do 3,5 m wysokości. Zdolność kiełkowania owoców (nasiona) uzyskuje po 60 do 90 dniach stratyfikacji (przechowywania) w temperaturze od 2 do 5°C. Proces ten w warunkach naturalnych następuje w okresie zimy, po uprzednim rozsianiu się nasion. Nasiona zachowują silną kiełkowanie przez okres 4 lat. Młode rośliny barszczu Sosnowskiego są bardzo podobne do siewek barszczu zwyczajnego. Lisińcami są wydłużone, pierwsze liście początkowo są okrągawe, a w miarę wzrostu stają się trojkatne. Do końca wegetacji jesiennej tworzą rozetę o liściach osiągających 15 do 35 cm wysokości. Z tej rozety, pod koniec maja lub na początku czerwca, zaczyna wybiąć łodyga. Liście wyrażające z rozety są bardzo duże i osiągają niekiedy od 150 do 200 cm długości. Łodyga oraz wszystkie liście na dalszej stronie są delikatnie owłosione. Korzeń kształtu paliwowego, w gorniej części dosyć silnie rozgałęziony, wyrasta nawet do 200 cm głęboko w ziemię, jednak jego największa masa znajduje się w warstwie do głębokości około 30 cm. Kwiatostany tworzą baldachy złożone z baldaszków. Największy baldach jest położony centralnie i posiada średnicę od 30 do 70 cm. Proces dojrzewania nasion rozpoczyna się w drugiej połowie lipca, po ich wydaniu rośliną obumiera w sposób naturalny.

Opis uszkodzeń i szkodliwości

Barszcz Sosnowskiego pochodzi z Kaukazu. Do Polski został sprowadzony na początku lat 50-tych do prac badawczych. Ze względu na dużą masę jaka wywarza, sądzono, że pomoże on rozwiązać problemy paszowe rolnictwa. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku został więc rozpowszechniony w niektórych rejonach kraju jako roślina pastewna. Eksperymentalnie był uprawiany w wielu ośrodkach na terenie całego kraju. Szczególnie dużym powodzeniem cieszyła się uprawa tej rośliny na Podhalu oraz na pogórzu Sudeckim. Szybko okazało się jednak, że wartość paszowa barszczu Sosnowskiego jest znacznie mniejsza niż się spod kontroli „uciekł” z pod uprawnych i rzekomością się do siedlisk naturalnych gdzie znalazły doskonałe warunki do wzrostu i rozwoju, i tym samym bardzo szybko się rozpowszechniły. Obecnie jego występowanie jest notowane na terenie całego kraju. W Polsce południowej, południowo-wschodniej i północno-zachodniej występuje dość powszechnie. Początkowo barszcz Sosnowskiego pojawił się w siedliskach ruderalnych, do których należą przydroża, szlaki turystyczne, nieużytki, następnie zaczął występować na odcinkach, a obecnie staje się bardzo kłopotliwy w leśnictwie i na niektórych użytkach zielonych, a niekiedy nawet na polach uprawnych. Naiżczęściej występuje on na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów rowów.

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachośczającą teren, a dodatkowo wioski na liściach i łodygach wydzielają substancję parzącą. Roztarte liście lub łodyga mają charakterystyczny zapach kumaryny. Parzące działanie tego związku nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany i dugo nie zanikające blizny oraz zapalenie spojówek. Działanie to jest szczególnie niebezpieczne dla alergików i dzieci. Ta negatywna cecha barszczu Sosnowskiego spowodowała konieczność intensywnego zwalczania tego chwasty.

Metoda mechaniczna jest najprostszą metodą zwalczania rośliny. Najskuteczniejsze jest niszczenie roślin jednorocznych. Termin jesienny należy uznać za najlepszy, ponieważ w tym okresie rośliny jednoroczne są w pełni dojrzałe i łatwe do usunięcia. Niszczenie roślin może polegać na ręcznym (dłonią w rękawicach) usuwaniu przy pomocy motyka bądź też specjalistycznego sprzętu. Barszcz Sosnowskiego można także niszczyć mechanicznie w drugim roku wegetacji, gdy wyraстаją pędy. Zabieg te koniecznie należy wykonywać przed owocowaniem, a na kolejny rok tuż przed lub w trakcie kwitnienia. Najbardziej powszechna i skuteczna metoda jest jego wykaszanie. Na ogół, w ciągu jednego sezonu, potrzebnych jest co najmniej od 2 do 4 zabiegów wykaszania. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że im wyżej koszone są rośliny, tym większe prawdopodobieństwo odniesienia nowych baldachów na niższych piętrach. Do tego zjawiska dochodzi masowo wówczas, gdy usuwane są tylko same baldachy. Ponadto koszenie sprawia, iż rośliny barszczu „stają się” wieloletnie. Pozbawione możliwości wydania pędów generatywnych, ciągle dążą do wydania kwiatostanu. Calkowite wyeliminowanie roślin polega na ich „zmęceniu”, czyli bardzo częstym koszeniu. W takiej sytuacji, w pewnym momencie można przejść na walkę chemiczną, która, w określonych przypadkach moźliwa wykorzystać jako jedyną i podstawową metodę. Herbycydy, zawierające gifosat, nie są zalecane do bezpośredniego zwalczania barszczu, ale można z nich skorzystać, jako że są to środki nieselektywne, służące do zwalczania zbędnej roślinności. Roundup 360 SL, lub inne preparaty oparte na glifosacie zalecane są w dawkach 4,5 do 8 l/ha. Dawki niższe stosuje się podczas wiosny oraz późnym latem i jesienią, na rośliny barszczu w fazie silnie rozgałęzionych rozet. Dawki najwyższe zalecane są, na dorosłe rośliny, które zaczynają wchodzić w okres spoczynku wegetacyjnego. Stosowanie środka Roundup 360 SL powoduje osiągnięcie sity kiełkowania nasion. Dlatego późne zabiegi nie tylko osłabiają lub niszczą wieloletnie rośliny barszczu, ale także ostabiają, zdolność kiełkowania nasion. Dawki pośrednie, około 6 l/ha, stosuje się na jednorocznego rośliny wchodzącej w okres kwitnienia lub na rośliny osiąbione poprzednim zabiegiem. W miejscach, na których doszło do rozsiania się nasion barszczu, walkę należy zaplanować na 3 do 4 lat (zgodnie z żywotnością nasion). Zabiegi opryskiwania można wykonać w trzech terminach:

- wiosną do połowy maja, na siewki (do fazy rozety).
- wczesnym latem, od czerwca, w okresie wywarzania pędów kwiatowych, do początku kwitnienia.
- późnym latem do jesieni, gdy rośliny osiągną fazę dobrze rozwiniętej rozety (wysokość roślin od 15 do 35 cm).
- późnym latem do jesieni, na osobniki wiełoletnie, gdy rośliny zaczynają gromadzić substancje pokarmowe w korzeniach.

UWAGA: Wszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego bez względu na stosowaną metodę i wykonywaną pracę, muszą być dokładne informowane o szkodliwości oraz toksycznych i parzących właściwościach tej rośliny, ponadto muszą być wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne.

Opracowanie:
Prof. dr hab. Kazimierz Adamczewski,
int. Adam Paradowski
Instytut Ochrony Roslin w Poznaniu